

distinctis, secunda et tertia confluentibus. Spira conica, apice sat magno, obtusiusculo, laevi; sutura impressa, subrenulata. Anfractus  $5\frac{1}{2}$  celeriter sed regulariter crescentes, superi convexiusculi, inferi convexiores, ultimus magnus, rotundatus, antice leniter descendens. Apertura diagonalis, lunato-circularis, intus albido-fuscescens fasciis obscure transluculentibus: peristoma obtusulum, expansum, extus et ad basin brevissime reflexum, late hepatico limbatum, marginibus conniventibus, columellari arcuatim ascendente, hepatico, supra dilatato, appresso, ad insertionem sulco superficiali cincto. —

Alt. 50, diam. maj. 50, min. 44 mm.

Hab. Moraca. Montenegro.

Eine höchst merkwürdige Art, welche Hel. pomatia und lucorum verbindet. Ich bringe sie wie die anderen beschriebenen Arten im Schlussheft des achten Bandes der neuen Folge der Iconographie zur Abbildung.

### Eine neue *Jacosta*.

Von

H. Rolle.

#### *Jacosta andrewi* n.

Testa late et infundibuliforme umbilicata, depresso lenticularis, solida, haud nitens, tricarinata, undique ruditer et confertim costellato-striata. Spira depressa, apice vix prominulo. Anfractus 5— $5\frac{1}{2}$ , embryonales laeves, convexiusculi, sequentes distincte carinati, ad carinam compressi, infra suturam tumidi, penultimus et ultimus torulo distincto prominente subsuturali muniti, ultimus ad peripheriam carina utrinque compressa distinctissima et circa umbilicum carina altera vix minus distincta, extus sulco definita munitus, interstitio plano; sutura distincta, subirregularis.

Apertura irregulariter rhomboideo-piriformis, ad peripheriam valde sinuata, intus canaliculata; peristoma tenue, intus tenuiter sed distincte labiatum, margine collumellari angulum distinctum cum basali formante, dein dilatato

Diam. maj. 11, min. 9,5, alt. vix 5 mm.

Hab in monte Chrysostomo ins. Cyprus.

### Eine neue Zonites.

Von

Dr. W. K o b e l t.

#### *Zonites cilicicus* n.

Testa late et fere perspectiviter umbilicata, depresso globoso conoidea, solidula, haud diaphana, nitida, irregulariter ruditerque striata, in anfractibus superis distincte, in ultimo minus distincte granulata, infra peripheriam laevior, lutescenti-brunea, obscure fasciata, circa umbilicum pallidior. Spira convexo-conica, supra late obtusata, apice parvo. Anfractus 6—6½ lente ac regulariter crescentes, embryonales subtilissime granulosi, plani, sequentes convexiusculi, carinadistincta suturam impressam sequente insignes, ultimus vix dilatatus primum subangulatus, demum fere regulariter rotundatus. Apertura obliqua, lunata, fere circularis; peristoma tenue, acutum, intus vix levissime labiatum faucibus coeruleis, basali arcuato, ad insertionem vix dilatato.

Diam. maj. 34, min. 27,5, alt. 13, diam. apert. obl. 12,5 : 13,5 mm.

Hab. Giosna prope Mersina Ciliciae; leg. Rolle.

Von mir bei der Bearbeitung von Rolles Ausbeute übersehen. Es ist bis jetzt die am weitesten östlich vorgeschobene Form der Gattung Zonites; sie schliesst sich namentlich durch die abgestumpfte Spira an meinen Z